

Fauna



cena: 35 Kč / 39 Sk



16

9 771211 538002

Fotografie na titulní straně

Trnorep africký – *Uromastyx acanthinura* Bell, 1825

Asi nejznámější a chovatelsky nejčastěji zastoupený druh rodu *Uromastyx* Merrem 1820, který v dnešní době čítá na sedmnáct druhů. Zástupci tohoto rodu čeledi Agamidae jsou rozšířeni v severní Africe, přes oblast Sahelu po Africký roh, severně pak zasahují na Blízký východ a až do severozápadní Indie. Jedná se o středně velké, silně stavěné, herbivorní ještěry s charakteristickým trnitým ocasem, který slouží především k obraně a není schopen autotomie. Trnorep africký (*Uromastyx acanthinura*), v arabsky mluvících zemích obecně nazýván „dabb“, je relativně běžný druh agamy rozšířený především v pouštních a skalnatých oblastech severní Afriky.

Jedinci na fotografii byli nalezeni a vyfotografováni ve vnitrozemí Maroka poblíž hranice s Alžírskem. Lokalita nedaleko městečka Boudenib ležela v nadmořské výšce přes 1000 metrů a teplota na lokalitě se v brzkých ranních hodinách pohybovala kolem 3 °C. Skalní pukliny a nory v zemi, jež tento druh vyhledával a využíval jako přirozené úkryty, měly při měření jejich teploty kolem 8,5 °C! Navíc podklad byl dosti vlhký. Jak by se tedy z chovatelského hlediska zdálo, podmínky byly více než nevyhovující. To je však jen zdání, které vychází z nedostatečných informací biologie a zejména pak etologie druhu ve volné přírodě.



Celkové podmínky na těchto lokalitách jsou často ještě drastičtější. Teploty na takovýchto místech značně oscilují a v poledne jsou zdejší plazi již tak vyhřátí, že je těžké se k nim vůbec přiblížit.

Druh je chovatelsky velice žádaným a v oblastech svého výskytu je také využíván jako součást tradiční medicíny, resp. léčitelství. Pro své přímé ohrožení je tedy zařazen na seznamu CITES.

Poddruh obývající zdejší oblast a který je tedy zachycen i na titulní straně, je nominotypický *Uromastyx acanthinura acanthinura*.

text a foto: Daniel Jablonski